

Autoécologie des PEUPLIERS

dant toute la saison de végétation. Les sols secs et même moyennement secs ne conviennent pas aux cur- américains

◆ au déboulement printanier la présence d'une tranche pédologique supérieure 40cm bien aérée, libre d'engorgement d'eau

◆ repli esival de la nappe phréatique entre 80cm et 1,20m de prof. accompagnée de bonnes remontées capil-

Ces exigences/tolérances hydriques les situent en position intermédiaire entre l'aulne glutineux et le

Le Peuplier Trichocarpa
trène commun.

Le peuplier *trichocarpa* n'est pas une espèce vallisicole et vit dans des forêts croissant sur sols bruns acides de l'ouest nord-américain. C'est une es-

sence acidocline (pH eau favorable : 4,5 à 6), mésotrophe (pas de tendance calci-nitrophile affirmée), assez souple par rapport aux textures (meilleure valorisation des sols G par ex.), hygrocline de sols non vallicales

mais à bonne économie hydrique.
Les hybrides interaméricains
Les hybrides interaméricains ont su conserver une partie de ces tolérances stationnelles et grâce à cela ils ont incontestablement amené une nouvelle dimension à la population moderne

Alain, leur caractère acidoclines à neutroclines (pH eau favorable de 5 à 7,5) et leur préférence pour des sols mésos-eutrophes leur permettent de prospérer sur des sols plus acides et moins riches que les euméricains. Ils sont également plus souples par

rapport à la texture (S, F, L, A et B constituent des classes texturales à priori valables, meilleure acceptation des sols G, U, V et Z restant par contre exchifs), ils peuvent notamment provoquer sur des sols plus lourds et plus caillouteux que les curaméricains. Enfin ils sont hygroclinales - hygro-

1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497
 2498-2499
 2500-2501
 2502-2503
 2504-2505
 2506-2507
 2508-2509
 2510-2511
 2512-2513
 2514-2515
 2516-2517
 2518-2519
 2520-2521
 2522-2523
 2524-2525
 2526-2527
 2528-2529
 2530-2531
 2532-2533
 2534-2535
 2536-2537
 2538-2539
 2540-2541
 2542-2543
 2544-2545
 2546-2547
 2548-2549
 2550-2551
 2552-2553
 2554-2555
 2556-2557
 2558-2559
 2560-2561
 2562-2563
 2564-2565
 2566-2567
 256

A. PARFONRY
— Les meilleures productions des Boclore et des
Beaupré sont cependant engraisées en stations
vallées, sur des alluvions fertiles à hydromor-
phie moyennement superficielle, ce qui constitue
également les meilleures stations à eumétricités
(Ghoy par ex.)

ques, d'après « La Pratique Hainaut (à paraître).

américains (Ghy, Gaver, Ogy)

quelques cv. de saules)
américains (Goy, Gaver, Isières, Ogy,
américains (Boelare, Beaupré)

araméricains (Choy, Gaver, Isières, Ogy)
eraméricains (Boelare, Beaupré)

Les grands cours d'eau, les plus aptes aux élagages forestiers ou aux regarnissements tardifs en peupliers.

Le peuplier noir et deltoïde (ainsi que leurs hybrides euraméricains)

Leur caractère hygrophilie recher-
(valables),
mar contre les sols S, P, L, A et E sont
excellent (la plupart des G),
temp (Z), sols trop lourds (U), sols
de ce bon équilibre (sols trop sablon-
tude à valoriser des sols qui s'écartent
bien équilibrées et, n'ont guère d'ap-
en NO₃). Ils apprécient les textures
philes (exigentes quant à la richesse
Ca, Mg...), et même à tendance nitro-
casse chimique des sols (en K, P,
de 5,5 à 7,5), exigeants quant à la ri-
cines/neutrophiles (pH eau favorable
sont donc des végétaux neutro-

des arbres de formation non marécageuses, notamment des aulnaies marécageuses (*Alynon glutinosae*); donc, les sols à hydromorphie constante ou forte superficielle où l'eau stagne en surface une bonne partie de l'année (avec le gley apparaissant dans la couche 0-40 cm de profondeur constante pas le régime hydrique type. Par contre ces peupliers sont plutôt des arbres de ripisylves (*Salix alba* et *Ahno-Padon*), donc des sols à hydromorphie importante sont nécessaires pour leur correct développement et qu'ils doivent garantir la constance d'une bonne alimentation en eau pen-

Résumé des exigences hydriques de la Populiculture

sés. Aussi sont-ils les plus aptes aux regarnissages forestiers ou aux regarnissages tardifs en peupleraies.

Catégories theromiques

maie globalement doux et les longues
 constater que, pour eux aussi, le cli-
 Haute Ardennne. Cependant, il faut
 rieur de la Moyenne Ardennne et de la
 santes, à l'exception de la partie supé-
 leur permet des productions satisfai-
 pratiquement toutes les régions belges
 mésophiles: le régime thermique des
 se rapprochent plus de la catégorie des
 testablement innové en la matière et
calus et trichocarpa purn ont incon-
 Enfin, les *hybrides interarmen-*
 ge) ne leur conviend pas du tout.
 ci (Ardennne, parties de Lorraine bel-
 Haute Belgique et la majorité de celle-
 en Basses et Moyenne Belgique qui en
 Le Gaver sont beaucoup plus à l'aise
 portementale à cet égard. Le Gnavy et

Comportement par rapport aux caractères édaphiques

On parlera principalement des hybrides euraséens et interaméricains.

Catégories phoriques

Tous les peupliers sont des arbres moyennement héliophiles : héliophile strict à héliophile comme à l'état adulte. Il faut donc distinguer différents degrés à ce tempérament héliophile : Les eurytemperants anciens et nouveaux sont les plus héliophiles

[illegible]

Les interaméricains sont un peu moins héliophiles (tout en restant à un niveau élevé d'héliophilie) ce qui leur permet d'être plus à l'aise dans des températures élevées.

**Résumé de la filière de
sélection popultroie
utilisant les peupliers noir,
deltroïde et baumier
peuplier noir
x
peuplier deltroïde
euraméricains**

peuplier deltoïde
x
peuplier trichocarpa

cultivars récents à (postérieurs à 1975)
Primo, Ghoy, Gaver, Gibeck, Isières, Ogy

viens cultivars (antérieurs à 1975)
Serjolina, Gelrica, 1214, Robusta, Regenerata ..

interaméricains ↑
Unal, Beauré, Boelare, Raspalle,
Hunnegeim[®] Hazendans, Hoogvorst[®]

peuplier trichocarpa ↑
Frizi Pauley, Columbia River, Trichobele[®]

(11): d'autres stations populaires situées dans de nombreux autres pays ont été visitées pour des raisons budgétaires.

(4) : récents cv. interaméricains sélectionnés par l'I.B.W. de Grammont et disponibles à partir de 1998/1999.

massifs n'ont pas de stations un peu moins généralement isolées, ce qui autorise un peu plus de souplesse au niveau des regroupements et parfois même de les utiliser en enrichissements (par groupes dans les forêts).

91

Exemple de schéma d'élagage-formation durant la vie d'un peuplement
(à adapter en fonction des règles mentionnées, de la situation des arbres, etc.)

- ◆ **A 4 ou 5 ANS**
 - défouircher si nécessaire
 - élaguer la tige sur 1/3-1/2 de la hauteur totale
 - enlever (rabattre) dans les verticilles supérieurs d'éventuelles branches trop fortes
- ◆ **A 6 ou 7 ANS**
 - défouircher si nécessaire
 - élaguer (émondar) la tige jusqu'à 6-7 m, sans dépasser 1/2 de la hauteur totale
 - enlever (rabattre) jusqu'à 9-11 m d'éventuelles branches trop fortes
- ◆ **A 8 ou 9 ANS**
 - élaguer (émondar) jusqu'à 9-11 m

II. J. -P. H. BAUVIN
Institut Sup. Agr. de la prov. de Hainaut/Vith - C.A.R.A.H.

Les modalités pratiques de ces opérations sont classées, c'est-à-dire que l'on pratique des plaies saines et non saines, laissant de côté tout en respectant le bonnet cicatriciel présent à la base des branches. Il existe une gamme d'outils pour ce faire : émondoirs à mancheau, sécateurs, sécateurs égoûtes, mini-tronçonneuses nouvelles et des outils indépendants des échelles sont rarement utilisés. Le travail dépend avant tout du bon sens du manipulateur et de la qualification de l'opérateur.

Les tailles de formation, les étages et les émondagages sont idéalement pratiqués en période de repos végétatif, c-à-d. approximativement de la mi-novembre à la fin mars, hors période de gel important (en deçà de -2°C ...). Ces interventions sont parfois pratiquées hors de cette période mais on ne peut que déconseiller vivement la période de pleine montée de sève (juin-août).

de bois, sans crainte de qualité! En pratique, l'élagage sera effectué en 2, 3 voire 4 passages, sur un tronç de diamètre compris entre 10-12cm et plus. Ils est même, classiquement, jusqu'à une hauteur de 10-12m maximum. Une autre règle générale conseille de maintenir le rapport hauteur largeur/tauterie totale aux environs de 1/2 (ou même 1/3). Une taille de formation bien menée précédemment (si nécessaire) limitera l'élagage à couper des branches d'un diamètre généralement inférieur à 3-4 cm, ce qui ne pose pas de problèmes de circulation pour des arbres à haute capacité végétative comme le sorbier les pemppliers. Un élagage excessif induira un stress, une perte de croissance et un affaiblissement avec comme conséquence une sensibilité aux attaques parasites. De plus, l'apparition de noueux gourmands oblige souvent à pratiquer un émondage. Tout cela aura des répercussions sur la rente

Ainsi, la *qualité devouillage* est évidemment la mieux valorisée et signifie produire un bois le plus blanc possible et sans tannin, même de tout début tel que présence de noeuds, blessure ayant marqué le bois, perforation par insectes xylophages, présence de corps étrangers (restes de protections médicamenteuses, clous...). Une bonne récolte permet également d'optimiser les rendements en usine et sera donc un atout supplémentaire en matière de rentabilité des peuplements.

La *qualité sciage*, beaucoup moins payée, tient en des défauts tels que noeuds, tiges et autres colorations. Mentionnons pour mémoire la production de biomasse en bois de sapin. Ce secteur ne représente pas, actuellement, un débouché stable ou rémunérateur. Même si quelques achats de houppiers à usage de turfpaille sont à signaler, il s'agit là de cas occasionnels.

Il, J.-Ph. Bavin

Le secteur industriel a des exigences bien précises en matière de bois de

Marché du bois et objectifs de production

La géométrie, *geometria*, emboîte une vaste expérience mathématique, pour du moins au dénouage. Elle est souvent limitée aux 3-4 mètres au pied de l'arbre. La *rouleuse* est liée à des facteurs climatologiques et pathologiques (influence des roquettes). Non décevable, elle est naturellement le bois mûre, voire dérangé pour le dénouage. Les *fontes* d'épave gèlent dans le défilé de plantation effectuées en période de gel. Certains clones (1 214) y sont très sensibles. La *pouturine* du pied attaquait préférentiellement certains clones (Gel-rica), entraînant des pertes importantes.

Defaults occasionnels

milieu avec la vitesse de croissance des nouveaux clones, conduit à des récoltes de pins en plus courtes, voire à des densités de plantations plus élevées.

Signations que le Beaupré s'avère remarquable du point de vue blancheur du bois (70 à 75 % de bois blanc, avec un pourcentage clair !).

Pour être complet, il convient de signaler que le secteur industriel a, lui aussi, évolué: le matériel de déboisement est plus performant et laisse des coures non détrepés de diamètre plus réduit (6 cm au lieu de 12 cm).

de plançon en pépinière : au premier
e année, derrière leur taille durant la
deuxième année.

rentabilité possible. L'élagage s'effectue pratiquement toujours sur des branches vives. Il s'agit donc de faire un compromis entre l'enlèvement de branches pour produire une qualité optimale de bois et le maintien d'un maximum de branches pour produire une quantité maximale

Precisons encore que la présence de bois de teneur induit des déformations du séchage (des feuilletés de traversage apparaissent par contre un «taux cœur brun» prend une importance croissante avec l'âge de l'arbre. Des clores mal mis en station (stations hydromorphes, jounées) pourrout également présenter un cœur brun anormalment développé. Il s'agit là d'un caractère qui devient le signe d'un secteur industriel dont la préférence va au bois blanc (sans exception, par exemple en Angleterre) facile à vendre et/ou à imprimer (publicités sur les emballages) après le déroulage. La ten- des arbres plus jeunes, de dimensions inférieures à celles jusqu'à présent les mieux payées. Des raisons chimiques, de 140-150cm ou plus sont re- rances de 180cm ou plus. Cette tendance, ce-

après à subir les entailles effectuées sur les feuillets de déroulage et les rendent in-
utilisables pour la fabrication de produits
à base de papier. Ces trichocarpes présentent par
ailleurs un autre défaut : de nombreux
bourgeons dormants marquent les
feuilles et les rendent inutilisables.
Ces trichocarpes présentent par
ailleurs un autre défaut : de nombreux
bourgeons dormants marquent les
feuilles et les rendent inutilisables.

bois de tension: le bois pelucheux.

La qualité du bois de peuplier

Les clones actuellement commercialisés présentent des caractéristiques technologiques répondant bien aux exigences du secteur industriel. Cela est particulièrement vrai pour les nouveaux clones (série des UN/L). Il y a pas de décroissance notable de ces qualités avec l'âge, hormis, évidemment, des cas accidentels tels que pourritures, bris de tronç, etc.

Mentionnons une caractéristique fréquemment rencontrée chez les anciens clones : la présence d'un noyau dur.

**La producción
plan la premi**

Flayage
Cette opération permet la production d'une grume exempte de nœuds telle que requise pour le déroulage, garant de la meilleure

Les **regarnissages** sont à effectuer l'année qui suit la première année de plantation, au plus tard deux ans après. Au-delà, les plants remis ne sont pas trop concurrencés par les premiers installés et ne rattrapent pas leur retard. Idéalement, le regarnissage sera effectué avec les plants de dimension supérieure à celle de premiers plants lors de leur installation.

Un **dégagement** chimique, manuel ou mécanique, limitera la concurrence, principalement des herbacées. Cette opération revêt une grande importance les premières années du peuplement. Dans certains cas, il faut d'ailleurs des ennemis plus particuliers tels que chèvresauvage, houblon, susceptible de déformer voire étouffer les plants.

Quelle que soit la modalité de dégauchement envisagée, le travail doit être effectué avec un maximum de soin, en préservant les pieds des peupliers de toute atteinte. Nous ne devons jamais que les sujets sont installés à distance définitive et que tout manque ne pourra jamais être rattrapé. Un dégagement mécanique sera le mieux à même de faciliter l'accès aux peupliers et les opérations à y effectuer : tailles de formation, élagage. Un dégauchement chimique présente l'avantage de ne pas perturber le sol, les végétaux morts après traitement constituent un paillage efficace.

Taille de formation

Elle a pour but de maintenir une dominance apicale forte, c'est-à-dire de permettre le développement d'une tige unique, aussi rectiligne que possible.

L'unicité de la tige sera assurée par un ou plusieurs défouillages si nécessaires. Des pousses concurrentes de la flèche sont fréquemment le résultat de bris de pousses terminale, par des convales le plus souvent.

La taille de formation doit également viser à anticiper sur la pousse future de branches latérales. Les plus vigoureuses d'entre elles, peu importe la hauteur à laquelle elles se trouvent, seront raccourcies ou enlevées avant que l'élagage, systématique, n'ait à le faire, c'est-à-dire souvent quelques années plus tard. Elles auraient en effet atteint de bien trop importantes dimensions, ce qui impliquerait de grosses plaies à cicatriser et, probablement, un émonage ultérieur...

La taille de formation permet également, dans certains cas, de rectifier l'aplanissement de l'arbre, de restaurer sa verticalité, ce qui limitera l'appareillage de bois de tension, susceptible de se déformer après déroulage.

Ces tailles de formation sont à effectuer jusqu'à obtention d'une