

Bibliographie de l'article de Vanneste et al. :
« L'équilibre forêt-gibier, entre interactions complexes et défis de gestion »
Forêt.Nature 177 (oct.-déc.-2025)

- ¹ Allen, A. M., Månsson, J., Jarnemo, A., & Bunnefeld, N. (2014). The impacts of landscape structure on the winter movements and habitat selection of female red deer. *European Journal of Wildlife Research*, 60(3), 411-421. <https://doi.org/10.1007/s10344-014-0797-0>
- ² Angst, J. K., & Kupferschmid, A. D. (2023). Assessing Browsing Impact in Beech Forests : The Importance of Tree Responses after Browsing. *Diversity*, 15(2), 262. <https://doi.org/10.3390/d15020262>
- ³ Baltzinger, C. (2016). Pour une approche intégrée du rôle des ongulés sauvages dans l'assemblage des communautés végétales et le fonctionnement des écosystèmes. <https://hal.inrae.fr/tel-02605441v1>
- ⁴ Barrere, J., Boulanger, V., Collet, C., Beroud, T., Bonal, L., & Saïd, S. (2024). La simulation d'abrouissement : Un outil pour mieux comprendre l'effet de l'herbivorie par les cervidés sur les jeunes plants de Chênes. *Revue forestière française*, 75(1), 15-24. <https://doi.org/10.20870/revforfr.2024.7991>
- ⁵ Barthod, C. (1996). La gestion durable des forêts tempérées : Quelques défis pour le XXI^e siècle. *Revue Forestière Française*, 3, 235. <https://doi.org/10.4267/2042/26800>
- ⁶ Bernard, B. (2004). L'Intégration locale de la gestion durable : Effets de système et pratiques innovantes. Quatre études de cas en Belgique et en France. *Revue Forestière Française*, 3, 231-240. <https://doi.org/10.4267/2042/5095>
- ⁷ Bernard, M. (2018). Changements climatiques et herbivorie : Influence sur la régénération et le potentiel d'avenir des forêts mélangées [Doctorat, Université Montpellier]. <https://theses.hal.science/tel-02010545v1>
- ⁸ Bernes, C., Macura, B., Jonsson, B. G., Junninen, K., Müller, J., Sandström, J., Löhmus, A., & Macdonald, E. (2018). Manipulating ungulate herbivory in temperate and boreal forests : Effects on vegetation and invertebrates. A systematic review. *Environmental Evidence*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s13750-018-0125-3>
- ⁹ Bernier, N., & Trosset, J.-Y. (2024). Bois pourri et santé des forêts : Exemple du mélange épicéa (*Picea abies* [L.] Karst.) et mélèze (*Larix decidua* Mill.) en forêt subalpine de Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie). *Revue forestière française*, 75(2), 101-113. <https://doi.org/10.20870/revforfr.2024.8152>
- ¹⁰ Bertouille, S. (2008). Dynamique des populations de cerf en Région wallonne. *Forêt Wallonne*, 94.
- ¹¹ Bobiec, A., Kuijper, D. P. J., Niklasson, M., Romankiewicz, A., & Solecka, K. (2011). Oak (*Quercus robur* L.) regeneration in early successional woodlands grazed by wild ungulates in the absence of livestock. *Forest Ecology and Management*, 262(5), Article 5. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.05.012>
- ¹² Bödeker, K., Jordan-Fragstein, C., Vor, T., Ammer, C., & Knoke, T. (2023). Abrupt height growth setbacks show overbrowsing of tree saplings, which can be reduced by raising deer harvest. *Scientific Reports*, 13(1), 12021. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38951-8>
- ¹³ Boulanger, V. (2010). Pression d'herbivorie et dynamique des communautés végétales : Influence à court et moyen termes des populations de cervidés sur la diversité des communautés végétales en forêt [Doctorat, Université Nancy - Henri Poincaré]. <https://theses.hal.science/tel-00518080>
- ¹⁴ Boulanger, V., Baltzinger, C., Saïd, S., & Dupouey, J.-L. (2011). Relations cervidés-végétation forestière : Apports des suivis temporels. <https://www.researchgate.net/publication/292988730>
- ¹⁵ Boulanger, V., Saïd, S., Laurent, L., & Henry, C. (2024). Réduire le déséquilibre forêt-ongulés pour permettre le renouvellement des forêts. <https://hal.science/hal-04867704v1>
- ¹⁶ Candaele, R., Ligot, G., Licoppe, A., Lievens, J., Fichet, V., Jonard, M., André, F., & Lejeune, P. (2023). Interspecific Growth Reductions Caused by Wild Ungulates on Tree Seedlings and Their Implications for Temperate *Quercus-Fagus* Forests. *Forests*, 14(7), 1330. <https://doi.org/10.3390/f14071330>
- ¹⁷ Champagne, E., Raymond, P., Royo, A. A., Speed, J. D. M., Tremblay, J.-P., & Côté, S. D. (2021). A review of ungulate impacts on the success of climate-adapted forest management strategies. *Current Forestry Reports*, 7(4), 305-320. <https://doi.org/10.1007/s40725-021-00148-5>
- ¹⁸ Chassagneux, A., Calenge, C., Siat, V., Mortz, P., Baubet, E., & Saïd, S. (2019). Proximity to the risk and landscape features modulate female red deer movement patterns over several days after drive hunts. *Wildlife Biology*, 2019(1). <https://doi.org/10.2981/wlb.00545>
- ¹⁹ Churski, M., Bubnicki, J. W., Jędrzejewska, B., Kuijper, D. P. J., & Crowsigt, J. P. G. M. (2017). Brown world forests : Increased ungulate browsing keeps temperate trees in recruitment bottlenecks in resource hotspots. *New Phytologist*, 214(1), 158-168. <https://doi.org/10.1111/nph.14345>
- ²⁰ Churski, M., Charles-Dominique, T., Bubnicki, J. W., Jędrzejewska, B., Kuijper, D. P. J., & Crowsigt, J. P. G. M. (2022). Herbivore-induced branching increases sapling survival in temperate forest canopy gaps. *Journal of Ecology*, 1365-2745.13880. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13880>
- ²¹ Côté, S. D., Rooney, T. P., Tremblay, J.-P., Dussault, C., & Waller, D. M. (2004). Ecological Impacts of Deer Overabundance. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 35(1), 113-147. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.35.021103.105725>

- 22 **Cromsigt, J. P. G. M., Kuijper, D. P. J., Adam, M., Beschta, R. L., Churski, M., Eycott, A., Kerley, G. I. H., Myrsterud, A., Schmidt, K., & West, K.** (2013). Hunting for fear : Innovating management of human-wildlife conflicts. *Journal of Applied Ecology*, 50(3), 544-549. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12076>
- 23 **Cukor, J., Vacek, Z., Linda, R., Vacek, S., Marada, P., Šimůnek, V., & Havránek, F.** (2019). Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors. *Forests*, 10(4), 320. <https://doi.org/10.3390/f10040320>
- 24 **Daburon, H.** (1963). Les dégâts de cerf et de chevreuil en forêt. *Revue Forestière Française*, 11, 860. <https://doi.org/10.4267/2042/24509>
- 25 **Dufrêne, M., Blervaque, I., Bussers, M., Collard, Y., Coppée, Th., Larrieu, L., Royen, L., Lehaire, F., Vandenberg, A., Crespin, A., Simon, N., & de Wouters, Ph.** (2025). *Rapport final du projet DeadWood4Forests : Importance du bois mort pour des forêts vivantes et plus résilientes*. ULiège – Gembloux Agro-Bio Tech ; Centre National de la Propriété Forestière ; TER-consult ; Forêt.Nature ; Société Royale Forestière de Belgique. <https://hdl.handle.net/2268/330947>
- 26 **Dumas, N.** (2022). *La végétation concurrente de la régénération forestière : Évaluation des surfaces colonisées, modélisation de l'abondance et de l'impact sur la régénération ligneuse à l'échelle de la France* [Doctorat, AgroParisTech]. <https://pastel.hal.science/tel-03957202v1>
- 27 **Fichet, V., Branquart, E., Claessens, H., Dufrêne, M., Delescaille, L.-M., Graitson, E., Paquet, J.-Y., & Wibail, L.** (2011). Milieux ouverts forestiers, lisières et biodiversité. *De la théorie à la pratique* (Série « Faune – Flore – Habitats », n°7, p. 184). Département de l'Étude du Milieu Naturel et Agricole (SPW-DGARNE). <https://hdl.handle.net/2268/112559>
- 28 **Fichet, V., Licoppe, A., & Lievens, J.** (2016). Des enclos-exclos au service des gestionnaires. *Forêt.Nature*, 139, 50-56.
- 29 **Forest Europe, UNECE, & FAO.** (2011). *State of Europe's Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe* (p. 337). Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. https://www.researchgate.net/publication/259231298_State_of_Europe's_Forests_2011_Status_and_Trends_in_Sustainable_Forest_Management_in_Europe
- 30 **Fuchs, Z., Vacek, Z., Vacek, S., & Gallo, J.** (2021). Effect of game browsing on natural regeneration of European beech (*Fagus sylvatica* L.) forests in the Krušné hory Mts. (Czech Republic and Germany). *Central European Forestry Journal*, 67(3), 166-180. <https://doi.org/10.2478/forj-2021-0008>
- 31 **Gebert, C., & Verheyden-Tixier, H.** (2001). Variations of diet composition of Red Deer (*Cervus elaphus* L.) in Europe. *Mammal Review*, 31(3-4), 189-201. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2907.2001.00090.x>
- 32 **Genikova, N. V., Mamontov, V. N., Kryshen, A. M., Kharitonov, V. A., Moshnikov, S. A., & Toropova, E. V.** (2021). Natural Regeneration of the Tree Stand in the Bilberry Spruce Forest. Clear-Cutting Ecotone Complex in the First Post-Logging Decade. *Forests*, 12(11), 1542. <https://doi.org/10.3390/f12111542>
- 33 **Gill, R.** (1992). A Review of Damage by Mammals in North Temperate Forests : 1. Deer. *Forestry*, 65(2), 145-169. <https://doi.org/10.1093/forestry/65.2.145>
- 34 **Gómez, J. M., & Hódar, J. A.** (2008). Wild boars (*Sus scrofa*) affect the recruitment rate and spatial distribution of holm oak (*Quercus ilex*). *Forest Ecology and Management*, 256(6), 1384-1389. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.06.045>
- 35 **Guignabert, A., Gonzalez, M., Delerue, F., Maugard, F., & Augusto, L.** (2020). La régénération du pin maritime dans les forêts dunaires d'Aquitaine : Un processus complexe et multifactoriel. *Rendez-vous Techniques de l'ONF*, Office national des forêts, 67-68, 52-60.
- 36 **Haaverstad, O., Hjeljord, O., & Wam, H. K.** (2014). Wild boar rooting in a northern coniferous forest – minor silviculture impact. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 29(1), 90-95. <https://doi.org/10.1080/02827581.2013.865781>
- 37 **Hagge, J., Müller, J., Bässler, C., Biebl, S. S., Brandl, R., Drexler, M., Gruppe, A., Hotes, S., Hothorn, T., Langhammer, P., Stark, H., Wirtz, R., Zimmerer, V., & Myrsterud, A.** (2019). Deadwood retention in forests lowers short-term browsing pressure on silver fir saplings by overabundant deer. *Forest Ecology and Management*, 451, 117531. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117531>
- 38 **Heinken, T., Hanspach, H., Raudnitschka, D., & Schumann, F.** (2002). Dispersal of vascular plants by four species of wild mammals in a deciduous forest in NE Germany. *Phytocoenologia*, 32(4), 627-643. <https://doi.org/10.1127/0340-269X/2002/0032-0627>
- 39 **Holgén, P., & Hånell, B.** (2000). Performance of planted and naturally regenerated seedlings in *Picea abies*-dominated shelterwood stands and clearcuts in Sweden. *Forest Ecology and Management*, 127(1-3), 129-138. [https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(99\)00125-5](https://doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00125-5)
- 40 **Hothorn, T., & Müller, J.** (2010). Large-scale reduction of ungulate browsing by managed sport hunting. *Forest Ecology and Management*, 260(9), 1416-1423. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.07.019>
- 41 **Hurstel, A., & Braconnier, N.** (2013). *Impact des Ongulés sur la myrtille* (*Vaccinium myrtillus*). Groupe Tétràs Vosges. <https://www.researchgate.net/publication/282665774>
- 42 **Ibáñez, I., Acharya, K., Juno, E., Karounos, C., Lee, B. R., McCollum, C., Schaffer-Morrison, S., & Tourville, J.** (2019). Forest resilience under global environmental change : Do we have the information we need? A systematic review. *PLOS ONE*, 14(9), e0222207. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222207>
- 43 **Jactel, H., & Marini, L.** (2021). Libre évolution des forêts et maîtrise du risque sanitaire associé aux scolytes des conifères. *Revue forestière française*, 73(2-3), 383-390. <https://doi.org/10.20870/revforfr.2021.5477>

- ⁴⁴ Kupferschmid, A. D., Bütikofer, L., Hothorn, T., Schwyzer, A., & Brang, P. (2020a). Ungulate Species and Abundance as well as Environmental Factors Determine the Probability of Terminal Shoot Browsing on Temperate Forest Trees. *Forests*, 11(7), 764. <https://doi.org/10.3390/f11070764>
- ⁴⁵ Kupferschmid, A. D., Bütikofer, L., Hothorn, T., Schwyzer, A., & Brang, P. (2020b). Ungulate Species and Abundance as well as Environmental Factors Determine the Probability of Terminal Shoot Browsing on Temperate Forest Trees. *Forests*, 11(7), Article 7. <https://doi.org/10.3390/f11070764>
- ⁴⁶ Latte, N., Perin, J., & Lejeune, P. (2016). Évolution récente des surfaces forestières et de la régénération des coupes rases en Wallonie. *Forêt.Nature*, 141, 46-51.
- ⁴⁷ Lehaire, F., Ligot, G., Morelle, K., & Lejeune, P. (2014). Les indicateurs de la pression du cerf élaphe sur la végétation du sous-bois en forêt feuillue tempérée (synthèse bibliographique). *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.*
- ⁴⁸ Lehaire, F., Morelle, K., Licoppe, A., & Lejeune, P. (2013). Les enclos-exclos : Une technique éprouvée pour l'évaluation et le monitoring de l'équilibre forêt-grande faune. *Forêt Wallonne*, 125, 3-14.
- ⁴⁹ Licoppe, A. (2008). Cervidés et biodiversité. *Forêt Wallonne*, 94, 3-17.
- ⁵⁰ Licoppe, A. (2024). *Gestion de la grande faune en milieu tempéré* [Support de cours inédit]. Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech.
- ⁵¹ Ligot, G., Gheysen, T., Arne, D.-S., Perin, J., Candaele, R., Licoppe, A., Arne, D.-S., Claessens, H., & Lejeune, P. (2023). Quel est le coût des dégâts d'écorcement dans les plantations d'épicéa ? *Forêt.Nature*, 168, 39-48.
- ⁵² Ligot, G., Gheysen, T., Perin, J., Candaele, R., De Colligny, F., Licoppe, A., & Lejeune, P. (2023). From the simulation of forest plantation dynamics to the quantification of bark-stripping damage by ungulates. *European Journal of Forest Research*, 142(4), 899-916. <https://doi.org/10.1007/s10342-023-01565-w>
- ⁵³ Lonsdale, W. M. (1999). Global patterns of plant invasions and the concept of invasibility. *Ecology*, 80(5), 1522-1536. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(1999\)080%255b1522:gpopia%255d2.0.co;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(1999)080%255b1522:gpopia%255d2.0.co;2)
- ⁵⁴ Lososová, Z., Axmanová, I., Chytrý, M., Midolo, G., Abdulhak, S., Karger, D. N., Renaud, J., Van Es, J., Vittoz, P., & Thuiller, W. (2023). Seed dispersal distance classes and dispersal modes for the European flora. *Global Ecology and Biogeography*, 32(9), 1485-1494. <https://doi.org/10.1111/geb.13712>
- ⁵⁵ Malík, K., Remes, J., Vacek, S., & Štícha, V. (2014). Development and dynamics of mountain spruce (*Picea abies* [L.] Karsten) stand regeneration. *Journal of Forest Science*, 60(2), 61-69. <https://doi.org/10.17221/98/2013-JFS>
- ⁵⁶ Massei (G.), Kindberg (J.), Licoppe (A.), Gacic (D.), Sprem (N.), Kamler (J.), Baubet (E.), Hohmann (U.), Monaco (A.), Ozolins (J.), Cellina (S.), Podgorski (T.), Fonseca (C.), Markov (N.), Pokorný (B.), Rosell (C.), Nahlik (A.). Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe. *Pest Management Science*, vol. 71, n° 4, 2015, pp. 492-500.
- ⁵⁷ Massonneau, R. (2010). Evaluation de l'impact des populations de cervidés sur la zone sommitale du Donon (Vosges du Nord). *Sciences de l'environnement*. <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01884442v1>
- ⁵⁸ Milne-Rostkowska, F., Holeksa, J., Bogdziewicz, M., Piechnik, Ł., Seget, B., Kurek, P., Buda, J., & Żywiec, M. (2020). Where can palatable young trees escape herbivore pressure in a protected forest? *Forest Ecology and Management*, 472, 118221. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118221>
- ⁵⁹ Mumme, S., Middleton, A. D., Ciucci, P., De Groeve, J., Corradini, A., Aikens, E. O., Ossi, F., Atwood, P., Balkenhol, N., Cole, E. K., Debeffe, L., Dewey, S. R., Fischer, C., Gude, J., Heurich, M., Hurley, M. A., Jarnemo, A., Kaufman, M. J., Licoppe, A., ... Cagnacci, F. (2023). Wherever I may roam. Human activity alters movements of red deer (*Cervus elaphus*) and elk (*Cervus canadensis*) across two continents. *Global Change Biology*, 29(20), 5788-5801. <https://doi.org/10.1111/gcb.16769>
- ⁶⁰ Myrsterud, A. (2006). The concept of overgrazing and its role in management of large herbivores. *Wildlife Biology*, 12(2), 129-141. [https://doi.org/10.2981/0909-6396\(2006\)12%255b129:tcoai%255d2.0.co;2](https://doi.org/10.2981/0909-6396(2006)12%255b129:tcoai%255d2.0.co;2)
- ⁶¹ Oeser, J., Kowalczyk, R., Kuijper, D., Neumann, W., Seidl, R., Senf, C., Reiner, R., Bluhm, H., Bonnot, N., Borger, L., Borowik, T., Cagnacci, F., Churski, M., Gehr, B., Heurich, M., Hewison, A., Jerina, K., Kröschel, M., Morellet, N., ... Kuemmerle, T. (2025). Increasing forest disturbance enhances habitat suitability for Europe's large herbivores. *In Review*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7824896/v1>
- ⁶² PEFC. (2024). Brochure informative sur l'équilibre forêt-gibier pour le propriétaire forestier. https://srfb.be/wp-content/uploads/2024/01/pefc_2024_foret_gibier_br_proprietaire-1.pdf
- ⁶³ Pellerin, S., Huot, J., & Côté, S. D. (2006). Long-term effects of deer browsing and trampling on the vegetation of peatlands. *Biological Conservation*, 128(3), 316-326. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.09.039>
- ⁶⁴ Picard, M. (2014). Influence de la dispersion endozoochore sur la composition des communautés végétales : Une approche fonctionnelle basée sur trois ongulés sauvages [Doctorat, Université d'Orléans]. <https://hal.inrae.fr/tel-02601116v1>
- ⁶⁵ Pirronitto, S., Schmitz, S., & Claessens, H. (2020). Le cèdre de l'Atlas en Wallonie : Premier état des lieux de la situation. *Forêt.Nature*, 157, 40-46.
- ⁶⁶ Ponge, J.-F., André, J., Bernier, N., & Gallet, C. (1994). La régénération naturelle : Connaissances actuelles. le cas de l'épicéa en forêt de macot (Savoie). *Revue Forestière Française*, 1, 25-45. <https://doi.org/10.4267/2042/26510>
- ⁶⁷ Price, D. T., Zimmermann, N. E., Lexer, M. J., Leadley, P., Jorritsma, I. T. M., Schaber, J., Clark, D. F., Lasch, P., McNulty, S., Wu, J., & Smith, B. (2001). Regeneration in Gap Models : Priority Issues for Studying Forest Responses to Climate Change. *Climatic Change*, 51, 475-508.

- ⁶⁸ **Ramirez, J. I., Jansen, P. A., & Poorter, L.** (2018). Effects of wild ungulates on the regeneration, structure and functioning of temperate forests : A semi-quantitative review. *Forest Ecology and Management*, 424, 406-419. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.05.016>
- ⁶⁹ **Ramos, J. A., Bugalho, M. N., Cortez, P., & Iason, G. R.** (2006). Selection of trees for rubbing by red and roe deer in forest plantations. *Forest Ecology and Management*, 222(1-3), 39-45. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.10.017>
- ⁷⁰ **Redick, C. H., & Jacobs, D. F.** (2020). Mitigation of deer herbivory in temperate hardwood forest regeneration : A meta-analysis of research literature. *Forests*, 11, 1-16. <https://doi.org/10.3390/f11111220>
- ⁷¹ **Reimoser, F., & Putman, R.** (2011). Impacts of wild ungulates on vegetation : Costs and benefits. In R. Putman, M. Apollonio, & R. Andersen (Éds.), *Ungulate Management in Europe* (1^{re} éd., p. 144-191). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511974137.007>
- ⁷² **Risch, A. C., Wirthner, S., Busse, M. D., Page-Dumroese, D. S., & Schütz, M.** (2010). Grubbing by wild boars (*Sus scrofa* L.) and its impact on hardwood forest soil carbon dioxide emissions in Switzerland. *Oecologia*, 164(3), 773-784. <https://doi.org/10.1007/s00442-010-1665-6>
- ⁷³ **Roy, V., Ruel, J.-C., & Plamondon, A. P.** (2000). Establishment, growth and survival of natural regeneration after clearcutting and drainage on forested wetlands. *Forest Ecology and Management*, 129(1-3), 253-267. [https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(99\)00170-X](https://doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00170-X)
- ⁷⁴ **Schmidt, M., Sommer, K., Kriebitzsch, W.-U., Ellenberg, H., & Von Oheimb, G.** (2004). Dispersal of vascular plants by game in northern Germany. Part I : Roe deer (*Capreolus capreolus*) and wild boar (*Sus scrofa*). *European Journal of Forest Research*, 123(2), 167-176. <https://doi.org/10.1007/s10342-004-0029-3>
- ⁷⁶ **Stroh, N., Baltzinger, C., & Martin, J.-L.** (2008). Deer prevent western red cedar (*Thuja plicata*) regeneration in old-growth forests of Haida Gwaii : Is there a potential for recovery? *Forest Ecology and Management*, 255(12), 3973-3979. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.03.039>
- ⁷⁷ **Unkule, M.** (2022). *Regeneration of Spruce-Fir-Beech mixed forests under climate and ungulate pressure* [UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES]. <https://theses.hal.science/tel-03722811>
- ⁷⁸ **Valkonen, S., Koskinen, K., Mäkinen, J., & Vanha-Majamaa, I.** (2011). Natural regeneration in patch clear-cutting in *Picea abies* stands in Southern Finland. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 26(6), 530-542. <https://doi.org/10.1080/02827581.2011.611818>
- ⁷⁹ **Vallée, M., Lebourgeois, F., Baudet, É., Saïd, S., & Klein, F.** (2016). Le sanglier en Europe : Une menace pour la biodiversité ? *Revue Forestière Française*, 6, 505-518. <https://doi.org/10.4267/2042/62398>
- ⁸⁰ **Van Lerberghe, P.** (2014). *Protéger les arbres contre les dégâts du gibier : Les manchons grillagés* (CNPf-IDF). https://www.researchgate.net/publication/280546712_Proteger_les_arbres_contre_les_degats_du_gibier_-_Les_manchons_grillages
- ⁸¹ **Vellend, M., Knight, T. M., & Drake, J. M.** (2006). Antagonistic effects of seed dispersal and herbivory on plant migration. *Ecology Letters*, 9(3), 319-326. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00878.x>
- ⁸² **Vera, F. W. M.** (2002). *Grazing ecology and forest history* (Reprinted). CABI.
- ⁸³ **Verheyden, H., Ballon, P., Bernard, V., & Saint-Andrieux, C.** (2006). Variations in bark-stripping by red deer *Cervus elaphus* across Europe. *Mammal Review*, 36(3), 217-234.
- ⁸⁴ **Vittoz, P., & Engler, R.** (2007). Seed dispersal distances : A typology based on dispersal modes and plant traits. *Botanica Helvetica*, 117(2), 109-124. <https://doi.org/10.1007/s00035-007-0797-8>
- ⁸⁵ **Von Oheimb, G., Schmidt, M., Kriebitzsch, W.-U., & Ellenberg, H.** (2005). Dispersal of vascular plants by game in northern Germany. Part II : Red deer (*Cervus elaphus*). *European Journal of Forest Research*, 124(1), 55-65. <https://doi.org/10.1007/s10342-005-0053-y>
- ⁸⁶ **Widar, J.** (2011). *Les dégâts de la faune sauvage en zone agricole : Identification, prévention, gestion et indemnisation*. Service public de Wallonie – Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement. https://www.fourragesmieux.be/Documents_telechargeables/livret19.pdf
- ⁸⁷ **Wirthner, S., Frey, B., Busse, M. D., Schütz, M., & Risch, A. C.** (2011). Effects of wild boar (*Sus scrofa* L.) rooting on the bacterial community structure in mixed-hardwood forest soils in Switzerland. *European Journal of Soil Biology*, 47(5), 296-302. <https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2011.07.003>